

 **Pluviométrie**
 **Cours d'eau**
 **Nappe**

Les cumuls de précipitations en Alsace au mois de janvier sont déficitaires d'environ -19 % par rapport à la valeur de référence, avec des valeurs variant de 30 à 75 mm sur l'ensemble du territoire et localement, de 75 à 150 mm sur les reliefs vosgiens.

Les débits moyens des cours d'eau de janvier sont encore en baisse par rapport à ceux du mois dernier. Les déficits varient de -25 % pour l'Ill amont (Didenheim), à -33 % pour les affluents du Rhin (-29 % Moder et -37 % Zorn), -42 % pour le Rhin lui-même (Lauterbourg) et -51 % en moyenne pour les affluents de l'Ill (-46 % Fecht, -49 % Bruche, -52 % Giessen, Lauch, et Thur, -53 % Doller).

L'évolution des niveaux moyens de la nappe en janvier est variable selon les secteurs, mais il se dégage néanmoins une légère tendance générale à la baisse, surtout dans le Haut-Rhin. Les niveaux se regroupent autour des normales de saison, avec des niveaux allant de modérément hauts (6 ans humide à Fessenheim) à modérément bas (4 ans sec à Rossfeld).

Pluviométrie

Evolution des précipitations mensuelles (en mm) et rapport à la normale (en %)


Le cumul de précipitations agrégées au mois de janvier est d'un peu moins de 60 mm en Alsace, soit un déficit global d'environ -19 % par rapport à la valeur de référence 1991-2020. A l'échelle de la région Grand Est, le cumul est comparable et affiche 65 mm, soit un déficit de -20 %. C'est le 3^{ème} mois déficitaire consécutif.

Pour le Bas-Rhin, les cumuls varient de 30 à 50 mm sur la moitié est et de 50 à 75 mm sur la moitié ouest du territoire, avec un quart sud-ouest localement un peu plus arrosé, de 75 à 150 mm.


Pour le Haut-Rhin, les cumuls sont majoritairement compris entre 30 et 50 mm. Seule la bordure ouest et les reliefs affichent des cumuls compris entre 75 et 150 mm.

Les bilans sont proches des moyennes saisonnières sur la plaine et légèrement déficitaires sur les autres secteurs, notamment au nord du Bas-Rhin et sur l'ensemble du Sundgau. Par département, les déficits sont de -13 % pour le Bas-Rhin et de -25 % pour le Haut-Rhin.

Précipitations janvier 2026



Rapport à la normale pour janvier 2026



Cours d'eau

L'hydraulicité du mois est le rapport entre le débit moyen du mois concerné et la moyenne des débits moyens de ce même mois sur toute la chronologie disponible.

Bassins	Affluents de l'Ill (Bruche, Giessen, Fecht, Thur, Lauch et Doller)	Ill Amont (Sundgau)	Affluents du Rhin (Zorn, Moder)	Rhin
Hydraulicité	0.49	0.75	0.67	0.58




Cours d'eau


Évolution des débits mensuels en (m³/s) et périodes de retour - 10 stations hydrométriques de référence



Situation des stations de mesures et évolution des niveaux de nappe



~ Débits mensuels pour les 12 derniers mois
 ~ Débits min mensuels



Données : APRONA, BD CARTHAGE®, BRAR, DREAL Grand Est, Région Grand Est

Avec des précipitations inférieures aux moyennes habituellement relevées pour un mois de janvier, les cours d'eau en subissent les conséquences, surtout après 3 mois de déficits consécutifs. Les hydraulicités observées en Alsace restent plutôt basses sur les cours d'eau issus du massif vosgien et affichent une valeur d'environ 0.5 (déficit de 50 %) sur la Doller, la Thur, la Fecht, la Lauch, le Giessen ou la Bruche. Sur l'Ill amont et l'Ill de plaine, ainsi que sur les affluents du Rhin (Moder et Zorn), les hydraulicités sont comprises entre 0.6 et 0.75 et n'atteignent pas les valeurs moyennes généralement observées


pour un mois de janvier. Le Rhin (à Lauterbourg) est légèrement en-dessous de 0.6 (déficit de 42 %).

Sur le bassin du Rhin, les débits moyens minimaux enregistrés pendant 3 jours consécutifs sont inférieurs au médian sur toutes les stations étudiées.



Niveaux de la nappe

Profondeurs moyennes mensuelles de la nappe (en m) par rapport au terrain naturel et périodes de retour
17 piézomètres de référence du Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS) Alsace



L'évolution des niveaux moyens de janvier est variable selon les secteurs par rapport au mois de décembre en Alsace.

Dans le Bas-Rhin, les niveaux sont en hausse, de +10 cm en bordure à Griesheim, +5 cm au nord à Wissembourg et +4 cm à Haguenau. Ils sont stables à Sessenheim, Weitbruch, Lampertheim et en baisse sur les autres sites, de -4 cm à Lipsheim, -6 cm à Reichstett, -8 cm à Rossfeld, jusqu'à -13 cm à Baldenheim. Les périodes de retour sont stables ou baissent légèrement, entre 3 et 4 ans sec à Lipsheim et Rossfeld, très proches de la normale au nord à Wissembourg et Sessenheim, ainsi qu'en bordure à Griesheim et Lampertheim, et de 2.5 ans à 3 ans humide sur tous les autres sites du département.

Dans le Haut-Rhin, les niveaux sont très majoritairement en baisse, à l'exception du Sundgau oriental (+20 cm à Habsheim). Les baisses varient de -2 cm à Guémar, entre -4 et -9 cm pour Fessenheim, Illhaeusern, Holtzwihr et Wittenheim, -12 cm à Wintzenheim, jusqu'à -14 cm en centre plaine ou à Cernay, et -24 cm à Héisingue. Les périodes de retour sont globalement en baisse, avec des niveaux proches de 3 ans sec à Illhaeusern, Holtzwihr et Cernay, autour de la normale à Guémar, Habsheim et Wintzenheim, entre 4 et 5 ans humide à Hettenschlag, Héisingue ou Wittenheim, et 6 ans humide le long du Rhin à Fessenheim.




Réservoirs

Évolution des volumes de remplissage (en Millions de m³)


La retenue de Michelbach, destinée à l'alimentation en eau potable, remonte encore nettement par rapport à début janvier, avec un taux de remplissage au 1^{er} février 2026 de 98 %. Le débit de restitution de la vanne se limite toujours au débit environnemental du Michelbach.

Pour le barrage de Kruth, le niveau observé au 1^{er} février est également en hausse par rapport à celui de début janvier, avec un taux de remplissage du barrage de 67 %, soit un volume d'environ 7.82 Mm³.

Retenue d'eau de Michelbach (7.3 M de m³)



Retenue d'eau de Kruth-Wildenstein (11.6 M de m³)



RETOUR SUR LA SITUATION DE L'AN DERNIER

Synthèse du Bulletin de Janvier 2025

“Les cumuls de précipitations en Alsace au mois de janvier sont excédentaires d'environ 36 % par rapport à la normale de référence. Les valeurs varient de 50 à 75 mm en plaine et de 75 à 150 mm ailleurs, localement jusqu'à 250 mm ou plus à l'ouest sur les reliefs. Les débits moyens des cours d'eau de janvier sont partout en hausse, avec des excédents importants selon les endroits par rapport aux normales saisonnières. Ils varient de +24 % pour le Rhin (à Lauterbourg), à +35 % de moyenne pour les affluents de l'III (+19 % Giessen, +24 % Thur, +30 % Lauch, +39 % Bruche, +40 % Doller, +58 % Fecht), +42 % pour les affluents du Rhin (+27 % Moder et +56 % Zorn) et +44 % pour l'III amont (à Didenheim). Les niveaux moyens de la nappe en janvier sont en hausse par rapport au mois dernier sur toute l'Alsace, sauf sur certains sites le long du Rhin. Les secteurs déficitaires en décembre sont remontés à hauteur des normales et les autres restent tous excédentaires.”

Plus d'infos



Ma commune

<https://carto.aprona.net/aprona/macommune/>



La nappe en direct

<https://www.aprona.net/FR/observatoire-eau/acces-aux-donnees/nappe-en-direct.html>



Carte de situation hebdomadaire

<https://www.aprona.net/situation-hebdomadaire.html>



Bulletin de situation hydrologique DREAL Grand-Est

<http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/bulletins-de-situation-hydrologique-r6869.html>



Bulletin de suivi des étiages DREAL Grand Est

<http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/bulletin-de-suivi-d-etiage-grand-est-a16960.html>

APRONA observatoire de la nappe d'Alsace

**APRONA 28 rue de Herrlisheim
68021 COLMAR**

03 67 82 00 50 - contact@aprona.net

www.aprona.net

Reproduction autorisée sous réserve de la mention de l'origine des données