

Le niveau de la nappe phréatique d'Alsace

Situation au 1^{er} août 2026

• Les niveaux moyens de la nappe en juillet poursuivent leur baisse par rapport au mois de juin, sauf localement le long du Rhin. Quelques secteurs restent encore à hauteur des normales de saison (Wintzenheim, Weitbruch, Fessenheim), les autres affichent des déficits variables, parfois importants, notamment à Lipsheim, Guémar ou Holtzwihr. A Rossfeld, le niveau enregistré en juillet est le plus bas jamais atteint depuis 1965.

• Par rapport aux valeurs du 1^{er} juillet, les niveaux de nappe du 1^{er} août sont en hausse de +12 cm à Fessenheim et en baisse partout ailleurs, de -14 cm à Rossfeld, -21 cm à Reichstett, -22 cm à Lipsheim, -23 cm à Sessenheim et Holtzwihr, -32 cm à Hettenschlag et -66 cm à Habsheim.

• Les cumuls de précipitations en Alsace au mois de juillet sont fortement déficitaires de -66 % par rapport à la normale 1991-2020, avec des valeurs allant selon les secteurs de 10 à 20 mm dans le sud haut-rhinois, jusqu'à peine 50 mm ailleurs, y compris sur les reliefs vosgiens.

• Les débits moyens des cours d'eau de juillet sont toujours en baisse par rapport au mois de juin, avec par conséquent des déficits qui s'accroissent. Ils varient de -51 % pour les affluents du Rhin (-45 % Moder et -56 % Zorn), -59 % pour le Rhin lui-même (Lauterbourg), à -74 % en moyenne pour les affluents de l'Ill (-54 % Thur, -61 % Doller, -71 % Bruche, -80 % Lauch et Fecht, -100 % Giessen), et -75 % pour l'Ill amont (Didenheim).

ÉCHELLE

TS : Très supérieur à la normale
S : Supérieur à la normale
N : Normale mensuelle
I : Inférieur à la normale
TI : Très inférieur à la normale

LÉGENDE

Niveau moyen mensuel par rapport à la normale saisonnière

Profondeur par rapport au sol (m)

6.15 **N** →

Variation par rapport au niveau du dernier bulletin du 1/07/2026



Niveau stable



Niveau à la hausse



Niveau à la baisse



Nappe phréatique



Piézomètre

APRONA

