

LE NIVEAU DE LA NAPPE PHREATIQUE D'ALSACE

Situation du 6 avril 2017

Le cumul moyen de précipitations* en Alsace pour le mois de mars est très déficitaire (56 mm, soit 18 % de la moyenne). La première décade est la plus arrosée, entre 15 mm et 50 mm pour la plaine alsacienne et de 40 mm à 125 mm pour le relief vosgien. Le déficit est sévère pour le reste du mois, compris entre -25% et -50%, voire -100 % par endroits.

Les débits moyens mensuels des cours d'eau* sont conformes aux normales sur le Sundgau, excédentaires pour les rivières vosgiennes (de + 10% à + 30%) et déficitaires pour les bassins du nord (- 10% pour la Zorn et - 24% pour la Moder). Pour le Rhin, la situation est conforme à la normale, avec un léger excédent (+ 10%).

Les niveaux moyens de nappe du mois de mars sont globalement en hausse par rapport au mois de février sur l'ensemble du territoire alsacien et se rapprochent doucement des normales saisonnières.

Par rapport aux valeurs du 10/03/2017, les niveaux de nappe du 6/04/2017 sont en hausse de + 7 cm à Sessenheim et Habsheim, et en baisse de - 25 cm à Holtzwihr, - 22 cm à Rossfeld, - 21 cm à Lipsheim, - 20 cm à Reichstett, - 9 cm à Fessenheim et - 4 cm à Hettenschlag.

ECHELLE

TS : Très supérieur à la normale
S : Supérieur à la normale
N : Normale mensuelle
I : Inférieur à la normale
TI : Très inférieur à la normale

LEGENDE

Niveau moyen mensuel par rapport à la normale saisonnière

Profondeur par rapport au sol (m)

6.15 N →

Variation par rapport au niveau du dernier bulletin du 10/03/2017

→ Niveau stable

↓ Niveau à la baisse

↑ Niveau à la hausse

— Cours d'eau

■ Nappe phréatique

■ Piézomètre

