

LE NIVEAU DE LA NAPPE PHREATIQUE D'ALSACE

Situation du 01 juillet 2021

Les cumuls de précipitations* agrégées en Alsace au mois de juin sont de 126 mm, soit un fort excédent global de 65 %. Ils varient de 75 à 200 mm selon les secteurs. Le bilan est excédentaire pour le Bas-Rhin de +50 à +100 % (localement +200 % au SO), et pour le Haut-Rhin, de +25 à +100 % (localement +10 à +25 % autour de Mulhouse).

Les débits moyens des cours d'eau* en juin sont en baisse par rapport au mois de mai, à l'exception du Rhin (+11 %). Les excédents sont encore malgré tout de +20 % pour l'Ill amont, +60 % pour la Doller, +70 % pour la Lauch, +75 % pour la Bruche et +85 % pour la Fecht. Les affluents du Rhin (Moder et Zorn) sont quant à eux en léger déficit pour la saison, entre -15 et -20 %.

Les niveaux moyens de la nappe en juin sont globalement en baisse dans le Bas-Rhin et en hausse dans le Haut-Rhin. Ils se maintiennent majoritairement au-dessus des normales saisonnières (Reichstett, Guémar, Holtzwihr,...) parfois très proches de celles-ci (Rossfeld, Fessenheim) et dans de rares secteurs, les déficits restent encore marqués, comme au mois dernier, en zone de bordure à Griesheim-près-Molsheim ou à Weitbruch.

Par rapport aux valeurs du 1er juin, les niveaux de nappe du 1er juillet sont en baisse de -4 cm à Sessenheim, stables à Rossfeld et Holtzwihr et en hausse ailleurs, de +5 cm à Hettenschlag, +19 cm à Habsheim, +22 cm à Lipsheim, +23 cm à Reichstett et +60 cm à Fessenheim.

ECHELLE

TS : Très supérieur à la normale
S : Supérieur à la normale
N : Normale mensuelle
I : Inférieur à la normale
TI : Très inférieur à la normale

LEGENDE

Niveau moyen mensuel par rapport à la normale saisonnière

Profondeur par rapport au sol (m)

6.15 N →

Variation par rapport au niveau du dernier bulletin du 01/06/2021

- Niveau stable
- ↓ Niveau à la baisse
- ↑ Niveau à la hausse

- Cours d'eau
- Nappe phréatique
- Piézomètre

