

Le niveau de la nappe phréatique d'Alsace

Situation au 1^{er} juillet 2026

• Les niveaux moyens de la nappe en juin sont encore en baisse par rapport au mois dernier, sauf localement le long du Rhin. De rares secteurs restent à peine au-dessus des normales (Weitbruch, Wintzenheim) ou tout juste à hauteur (Hettenschlag, Fessenheim), tandis que tous les autres secteurs sont désormais en déficit, jusqu'à atteindre un niveau décennal sec à Lipsheim.

• Par rapport aux valeurs du 1^{er} juin, les niveaux de nappe du 1^{er} juillet sont en hausse de +11 cm à Fessenheim et en baisse sur les autres sites, de -14 cm à Rossfeld, -18 cm à Holtzwihr, -21 cm à Lipsheim, -24 cm à Sessenheim, -25 cm à Reichstett, -45 cm à Hettenschlag et -59 cm à Habsheim.

• Les cumuls de précipitations en Alsace au mois de juin sont déficitaires de -33 % par rapport à la normale 1991-2020, avec des valeurs allant selon les secteurs de 30 à 50 mm en plaine et de 50 à 75 mm ailleurs, jusqu'à 100 mm localement sur les reliefs vosgiens.

• Les débits moyens des cours d'eau de juin sont en baisse par rapport au mois de mai et restent par conséquent inférieurs aux normales saisonnières. Les déficits varient de -50 % pour les affluents du Rhin (-43 % Moder et -56 % Zorn), -51 % pour le Rhin lui-même (Lauterbourg), à -68 % en moyenne pour les affluents de l'Ill (-53 % Thur, -58 % Doller, -60 % Fecht, -64 % Bruche, -81 % Lauch et -93 % Giessen), et -71 % pour l'Ill amont (Didenheim).

ÉCHELLE

TS : Très supérieur à la normale
S : Supérieur à la normale
N : Normale mensuelle
I : Inférieur à la normale
TI : Très inférieur à la normale

LÉGENDE

Niveau moyen mensuel par rapport à la normale saisonnière

Profondeur par rapport au sol (m)

6.15 **N** →

Variation par rapport au niveau du dernier bulletin du 1/06/2026

→ Niveau stable
↑ Niveau à la hausse
↓ Niveau à la baisse

■ Nappe phréatique
■ Piézomètre

APRONA

