

# LE NIVEAU DE LA NAPPE PHREATIQUE D'ALSACE

Situation du 10 mai 2019

Les cumuls moyens de précipitations\* en Alsace pour le mois d'avril sont de 68 mm, ce qui représente un excédent de 14 %, proche de celui du mois dernier. Ces cumuls sont compris entre 50 et 75 mm, voire 100 mm sur le sud du Bas-Rhin et le relief vosgien. Les bilans du mois sont excédentaires de 110 à 200 %, essentiellement sur la plaine rhénane.

Les débits moyens des cours d'eau\* sont en baisse en avril malgré les pluies observées et restent inférieurs aux normales, surtout pour le sud de l'Alsace (-60 %). Le Rhin est aussi déficitaire, mais seulement de 20 %.

Les niveaux moyens de la nappe en avril sont globalement en hausse par rapport au mois précédent, mais ils restent encore en dessous des normales saisonnières, sauf dans la moitié sud du Bas-Rhin (Lipsheim et Rossfeld). Certaines zones de bordures de la nappe comme le Sundgau oriental ou le secteur de la Fecht accusent toujours des déficits importants pour un mois d'avril.

Par rapport aux valeurs du 10 avril, les niveaux de nappe du 10 mai sont stables à Sessenheim, en baisse de -3 cm à Reichstett et Habsheim, -13 cm à Holtzwihr, -15 cm à Lipsheim, -24 cm à Rossfeld, et en hausse de +4 cm à Hettenschlag et +9 cm à Fessenheim.

## ECHELLE

TS : Très supérieur à la normale  
S : Supérieur à la normale  
N : Normale mensuelle  
I : Inférieur à la normale  
TI : Très inférieur à la normale

## LEGENDE

Niveau moyen mensuel par rapport à la normale saisonnière

Profondeur par rapport au sol (m)

6.15 N →

Variation par rapport au niveau du dernier bulletin du 10/04/2019

→ Niveau stable


↓ Niveau à la baisse

↑ Niveau à la hausse

— Cours d'eau

■ Nappe phréatique

■ Piézomètre



\* Données météorologiques (Météo France) et hydrologiques (DREAL Grand Est) extraites du bulletin hydrologique mensuel édité par l'APRONA.