

LE NIVEAU DE LA NAPPE PHREATIQUE D'ALSACE

Situation du 10 mars 2017

Le cumul moyen de précipitations* en Alsace pour le mois de février est de 63 mm, ce qui le situe à hauteur des normales saisonnières, mettant ainsi fin à une période très déficitaire. Les pluies sont essentiellement tombées en début et surtout en fin de mois, avec localement des moyennes très excédentaires sur le Haut-Rhin.

Les débits moyens mensuels restent très déficitaires sur l'ensemble de la région pour tous les cours d'eau* (- 50 % en moyenne), instaurant une situation d'étiage précoce, inhabituelle pour cette période de l'année.

Les niveaux moyens de nappe du mois de février sont en hausse par rapport à ceux de janvier sur la majeure partie de l'Alsace, excepté dans la moitié sud du Haut-Rhin. Ils sont globalement encore inférieurs aux normales, voire proches de celles-ci dans quelques secteurs comme au nord de Strasbourg, en centre plaine ou le long du Rhin.

Par rapport aux valeurs du 10/02/2017, les niveaux de nappe du 10/03/2017 sont en hausse de +6 cm à Lipsheim, +9 cm à Sessenheim, +12 cm à Rossfeld et Holtzwihr et +19 cm à Reichstett. Ils sont en baisse de -2 cm à Hettenschlag, -3 cm à Habsheim et -5 cm à Fessenheim.

ECHELLE

TS : Très supérieur à la normale
S : Supérieur à la normale
N : Normale mensuelle
I : Inférieur à la normale
TI : Très inférieur à la normale

LEGENDE

Niveau moyen mensuel par rapport à la normale saisonnière

Profondeur par rapport au sol (m)

Variation par rapport au niveau du dernier bulletin du 10/02/2017

→ Niveau stable

↓ Niveau à la baisse

↑ Niveau à la hausse

— Cours d'eau

■ Nappe phréatique

■ Piézomètre

