

LE NIVEAU DE LA NAPPE PHREATIQUE D'ALSACE

Situation du 15 octobre 2016

Les précipitations* du mois de septembre en Alsace sont déficitaires de 50% en moyenne, tout comme les 2 mois précédents. Le cumul moyen mensuel est de 41 mm, avec un maximum de 75 mm dans le Sundgau. La 2^{ème} décade a été la plus arrosée, mais le déficit reste important, jusqu'à 50% en plaine et jusqu'à 75% pour l'Alsace Bossue et les reliefs vosgiens.

Les débits moyens mensuels des cours d'eau* sont partout en baisse. Le déficit est compris entre 40 et 55% dans le Haut-Rhin, mais plus hétérogène dans le Bas-Rhin ; de 10 à 20% sur les affluents du Rhin, jusqu'à 90% sur le Giessen.

Les niveaux moyens de nappe du mois de septembre sont en baisse sur toute la région. Ils sont en dessous des normales saisonnières du sud de Strasbourg jusqu'au secteur de Colmar, ainsi que le long du Rhin.

Par rapport aux valeurs du 15/09/2016, les niveaux de nappe du 15/10/2016 sont stables à Reichstett, en hausse de +13 cm à Lipsheim, +8 cm à Rossfeld, +9 cm à Holtzwihr, +6 cm à Hettenschlag, et en baisse de -16 cm à Sessenheim, -8 cm à Fessenheim et -52 cm à Habsheim.

ECHELLE

TS : Très supérieur à la normale
S : Supérieur à la normale
N : Normale mensuelle
I : Inférieur à la normale
TI : Très inférieur à la normale

LEGENDE

Niveau moyen mensuel par rapport à la normale saisonnière

Profondeur par rapport au sol (m)

Variation par rapport au niveau du dernier bulletin du 15/09/2016

→ Niveau stable

↓ Niveau à la baisse

↑ Niveau à la hausse

— Cours d'eau

■ Nappe phréatique

■ Piézomètre

