

# LE NIVEAU DE LA NAPPE PHREATIQUE D'ALSACE

Situation du 01 octobre 2023

Les cumuls de précipitations\* agrégées en Alsace au mois de septembre sont d'environ 30 mm, soit un fort déficit global de -58 % par rapport à la valeur de référence 1991-2020. Les cumuls varient entre 20 et 50 mm sur tout le territoire alsacien, y compris sur le relief vosgien. Les déficits sont comparables pour les 2 départements, -55 % pour le Haut-Rhin et -61 % pour le Bas-Rhin.

Les débits moyens des cours d'eau\* en septembre sont en baisse par rapport au mois d'août et se situent par endroits au plus bas depuis le début de l'année. Les déficits se renforcent donc à nouveau, variant autour de -13 % pour le Rhin (à Lauterbourg), -40 % pour les affluents du Rhin (Moder et Zorn), -60 % en moyenne pour les affluents de l'Ill (-43 % Thur, -47 % Doller, -55 % Lauch et Bruche, -60 % Fecht, -89 % Giessen) et -67 % pour l'Ill amont (à Didenheim).

Les niveaux moyens de la nappe en septembre sont plutôt en baisse par rapport au mois d'août, avec de rares secteurs en hausse (nord de Colmar ou centre plaine à Hettenschlag). Ils restent partout inférieurs aux normales saisonnières, parfois très bas, notamment en zones de bordures à Griesheim (Bruche), Wintzenheim (Fecht) et Habsheim (Sundgau oriental).

Par rapport aux valeurs du 1er septembre, les niveaux de nappe du 1er octobre sont en hausse de +4 cm à Holtzwihr, +25 cm à Hettenschlag, stables à Rossfeld et en baisse ailleurs, de -3 cm à Lipsheim, -7 cm à Reichstett, -9 cm à Sessenheim, -12 cm à Habsheim et -33 cm à Fessenheim.

## ECHELLE

TS : Très supérieur à la normale  
S : Supérieur à la normale  
N : Normale mensuelle  
I : Inférieur à la normale  
TI : Très inférieur à la normale

## LEGENDE

Niveau moyen mensuel par rapport à la normale saisonnière

Profondeur par rapport au sol (m)

Variation par rapport au niveau du dernier bulletin du 01/08/2023

→ Niveau stable  
↓ Niveau à la baisse  
↑ Niveau à la hausse

— Cours d'eau  
■ Nappe phréatique  
■ Piézomètre

