

# LE NIVEAU DE LA NAPPE PHREATIQUE D'ALSACE

Situation du 15 septembre 2016

## ECHELLE

TS : Très supérieur à la normale  
S : Supérieur à la normale  
N : Normale mensuelle  
I : Inférieur à la normale  
TI : Très inférieur à la normale

## LEGENDE

Niveau moyen mensuel par rapport à la normale saisonnière

Profondeur par rapport au sol (m)

Variation par rapport au niveau du dernier bulletin du 10/08/2016

→ Niveau stable

↓ Niveau à la baisse

↑ Niveau à la hausse

— Cours d'eau

■ Nappe phréatique

■ Piézomètre

À l'image du mois de juillet, les pluies\* du mois d'août 2016 sont déficitaires de 50 % par rapport à la normale. Les cumuls de précipitations enregistrés par le réseau de mesures sont compris entre 20 mm (reliefs bas-rhinois et région colmarienne) et 65 mm.

La baisse des débits moyens mensuels des cours d'eau\* se poursuit sur l'ensemble des cours d'eau alsaciens. Les débits des cours d'eau du Haut-Rhin sont inférieurs aux valeurs saisonnières. Ils sont globalement conformes aux moyennes dans le Bas-Rhin.

**Les niveaux moyens de nappe** du mois d'août sont en nette baisse par rapport au mois de juillet sur l'ensemble du territoire alsacien. Ils restent malgré tout au-dessus des normales saisonnières au nord de Strasbourg et au sud de Colmar.

Par rapport aux valeurs du 10/08/2016, les niveaux de nappe du 15/09/2016 sont en baisse généralisée -32 cm à Sessenheim, -30 cm à Reichstett, -29 cm à Lipsheim, -14 cm à Rossfeld, -18 cm à Holtzwihr, -30 cm à Hettenschlag, -28 cm à Fessenheim et -75cm à Habsheim.

