

# LE NIVEAU DE LA NAPPE PHREATIQUE D'ALSACE

Situation du 01 septembre 2020

Les cumuls de précipitations\* en Alsace pour le mois d'août de 65 mm, soit un léger déficit de 9 %. Ils varient de 50 à 75 mm dans le Bas-Rhin et de 50 à 150 mm dans le Haut-Rhin. Le bilan se situe au voisinage de la normale ou en léger déficit (-10 à -25 %) dans le Bas-Rhin et varie autour de la normale (entre -25 et +25 %) dans le Haut-Rhin.

Les débits moyens des cours d'eau\* en août restent faibles et sont partout en dessous des normales saisonnières, avec des déficits parfois supérieurs à -60 % (Ill amont, Thur, Giessen), -50 % pour la Bruche ou la Zorn, et d'autres plus modérés, à peine -20 % pour l'Ill à hauteur de Strasbourg et pour le Rhin.

Les niveaux moyens de la nappe en août sont en baisse en Alsace par rapport au mois de juillet. Bien que les flèches de la carte soient à la hausse au 01/09 (par rapport au 01/08), la tendance sur tout le mois d'août est à la baisse, avec des niveaux relevés dans la partie centrale de l'Alsace désormais très inférieurs aux normales saisonnières, tout comme dans l'extrême sud du Haut-Rhin.

Par rapport aux valeurs du 1er août, les niveaux de nappe du 1er septembre sont en baisse de -9 cm à Sessenheim, -7 cm à Habsheim et en hausse ailleurs, de +1 cm à Hettenschlag, +6 cm à Lipsheim, +8 cm à Reichstett, +10 cm à Holtzwihr, +11 cm à Rossfeld et +19 cm à Fesseneheim.

## ECHELLE

TS : Très supérieur à la normale  
S : Supérieur à la normale  
N : Normale mensuelle  
I : Inférieur à la normale  
TI : Très inférieur à la normale

## LEGENDE

Niveau moyen mensuel par rapport à la normale saisonnière

Profondeur par rapport au sol (m)

Variation par rapport au niveau du dernier bulletin du 01/08/2020

→ Niveau stable  
↓ Niveau à la baisse  
↑ Niveau à la hausse

— Cours d'eau  
■ Nappe phréatique  
■ Piézomètre

